



אטלס



תרכיז מתחלב (EC)

קוטל חרקים מקבוצת הפיריתרואידים הסינטטיים להדברת מגוון חרקים בגידולים חקלאיים

מכיל: 100 גרם בליטר Bifenthrin

| קבוצת IRAC | מנגנון פעולה | משפחה כימית |
|------------|--------------------|-------------|
| 3A | פגיעה בתעלות הנתרן | Pyrethroids |

כללי: אטלס הינו קוטל חרקים המיועד להדברת מגוון מזיקים בגידולים שונים. התכשיר משתייך לקבוצת הפיריתרואידים הסינתטיים. אטלס פועל כרעל מגע וכרעל קיבה, פעילותו באה לידי ביטוי בפגיעה במערכת העצבים של המזיק. לתכשיר אין פעילות סיסטמית.

אופן היישום:

| הגידול | המזיק | מינון (סמ"ק/דונם) | ריכוז (אחוז) מעל 100 ליטר/דונם | נפח ריסוס | מועד אחרון לטיפול (ימים לפני קטיף) |
|-------------|--|-------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------|
| כותנה | כנימת עש הטבק, זחל ורוד, הליותיס (עד 15 מ"מ) | 75 | - | 30-15 | 21 |
| חיטה | כנימת עלה הדגן | 50 | - | 20-10 | 30 |
| חמצה | הליותיס, זבוב המנהרות | 75 | - | 30-15 | 21 |
| בקיה | חדקונית, האספסת (היפרה) | 50 | - | 30-15 | 14 |
| אגוזי אדמה | לפיגמה, הליותיס | 75 | - | 30-15 | 7 |
| מלון | לפיגמה, הליותיס | 75 | - | 40-15 | 7 |
| כרוב כרובית | עש לב הכרוב, עש הכרוב | 75 | - | 40-15 | 7 |
| פלפל פפריקה | תריפס קליפורני, לפיגמה | 75 | - | 60-20 | 7 |

| מועד אחרון לטיפול (ימים לפני קטיף) | נפח ריסוס | ריכוז (אחוז) מעל 100 ליטר/דונם | מינון (סמ"ק/דונם) | המזיק | הגידול |
|------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|---|------------------------|
| 7 | 50-20 | - | 50 | כנימת עש הטבק | חציל |
| 7 | 30-15 | - | 75 | פסילת הגזר | גזר |
| 7 | עד 100 ליטר/דונם לפי מינון מעל 100 ליטר/דונם לפי ריכוז | - | 50 | פלזידיה, הליותיס (עד 15 מ"מ) | עגבנייה |
| | | 0.15 | 75 | כנימת עלה הדלועיים, כנימת האפרסק | |
| 14 | 40-20 | - | 75 | חיפושית פרעושית | צנונית, צנון |
| 21 | 40-20 | - | 75 | חיפושית פרעושית | רוקולה |
| 30 | יישום בהגמעה | - | 1000 | מלדרה מטרידה | בטטה ⁽¹⁾ |
| 7 | 40-20 | - | 75 | כנימת עש הטבק, לפיגמה, כנימת עלה האפרסק, עש הפקעות | תפוז"א |
| 7 | 150-100 | 0.1-0.075 | - | עש האשכול | גפן |
| | | 0.1 | - | בוגרים של זבוב התסיסה | |
| 30 | 200-100 | 0.075 | - | ציקדות, עש החרוב, עש המשמש (אנרסיה), פשפש הכותנה | שקד |
| 14 | 150-100 | 0.075 | - | כנימת עלה הדלועיים | רימון |
| 30 | 200-100 | 0.05 | - | עש היסמין | זית |
| 3 | | 0.075 | - | פסילת האגס | אגס |
| 7 | | 0.075 | - | חיפושית הקליפה, ציקדות | שזיף |
| 7 | | 0.075 | - | ציקדות, זבוב הפירות הים תיכוני, חיפושית הקליפה, עש המשמש (אנרסיה) | אפרסק נקטרינה |
| 3 | | 0.075 | - | תריפס סורי, כנימה פלורידית, עש קליפת ההדר, פשפש הכותנה | אפרסמון ⁽²⁾ |
| 30 | | 400-200 | 0.05 | - | כנימת הפקאן הצהובה |
| 21 | 40-20 | - | 75 | פרודנייה (עד 10 מ"מ) | בזיל |
| - | מעל 100 ליטר/דונם | 0.075 | - | תריפס סורי | ורדים מורן אלמון הודי |

הערה:

1/ בדרך כלל דרושים 2-3 יישומים בתזמון מתאים לגלי הנגיעות של המזיק. היישום בהגמעה דרך מערכת הטפטוף עדיף. יש ליישם רק במערכות- טפטוף מנותקות אויר, בהזרקה פרופוציונלית במהלך השקיה של כ-12 קוב"ד' ובסיומה שטיפת הקו ב-3 קוב"ד'. ניתן ליישם בריסוס עלווה, בנפח תרסיס של לפחות 20 ל"ד' מלווה בהמטרה מיידית של 25-30 קוב"ד' להצנעת התכשיר בקרקע.

2/ אפרסמון: בדרגות 1+2 יש לשלב 0.5% שמן לגונה או לבנולה.



שילובים: ניתן לשלב עם התכשירים הבאים, (בכפוף לתווית התכשיר המשולב):

כותנה: סקור ת.מ.

פלפל: אופיר ת.מ.

עגבניה: בראבו ת.ר.

תפוז"א: בראבו ת.ר., אקרובט ג.ר.

מועד כניסה מחדש לשדה המטופל בתכשיר: לאחר 12 שעות. בבית צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

סכנות לסביבה:

באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ומקורות מים.

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות(III)

מס' או"ם: 3082

מס' רישיון הגה"צ: 1897/ה.צ./2007

אריזות: 1, 5 ליטר.



שמירה על הסביבה



מחייבות לבטיחות



איכות ללא פשרות



פיתוח מתקדם



ייצור כחול לבן