



תרכיז רחיף (SC) קוטל מחלות

מכיל : Flutriafol 125 g/l

מפשחה כימית	מנגנון פעולה	קבוצת FRAC
טריאזולים	מעכב ביוסינטזה של ארגוסטרול	3

כללי: איתן הינו תכשיר קוטל פטריות סיסטמי מקבוצת הטריאזולים המיועד להדברת חלפת בגזר, תפוח אדמה ובהדרים. להדברת קמחוניות בפלפל, חציל ובפרח השעווה ולהדברת קימחון בגזר.

אופן היישום:

מועד אחרון ליישום (ימים לפני קטיף)	נפח תרסיס	מינון		מחלה	גידול
		אחוז מנפח	סמ"ק/ דונם		
7	-	-	75	חלפת	תפוח אדמה ^{1/}
7	-	-	75	קימחון הגזר	גזר ^{1/}
				חלפת הגזר	
2	בהגמעה ^{2/} שני יישומים בלבד בעונה בהפרש של חודש ימים. טיפול ראשון מומלץ כחודש משתילה	-	100	קמחונות	פלפל ^{2/}
					חציל
120	ריסוס במרסס מפוח עד הרטבה. נפח לא פחות מ-300 ליטר/דונם למטע בוגר	0.15	-	כתמי חלפת (אלטרנריה)	הדרים: מינאולה
2	-	0.05	-	קמחונות	פרח שעווה*

הערות:

אין לרסס יותר משני טיפולים עוקבים. למניעה של התפתחות עמידות יש ליישם שני טיפולים בתכשירים מקבוצות כימיות שונות.
^{1/}בתפוח"א וגזר: אין ליישם את התכשיר יותר מ-3 פעמים בעונה.
 * פרח שעווה: בזן סגול

בטיפול הגמעה:

1. טיפולי מניעה בלבד. אין לראות בתכשיר תכשיר בודד להדברת המחלה לעונה כולה.
2. אין ליישם במצע מנותק.
3. אין ליישם בעת עקה (מים, אקלים ואגרוטכניקה).
4. אין להצמיא את הצמחים לפני או אחרי היישום ואין לראות את יישום התכשיר בהגמעה כחלק ממשטר ההשקיה.
5. יש להזריק את התכשיר מהול במים למערכת הטפטוף במערכות השקיה מנותקות אוויר.
6. לאחר היישום יש להזרים 1 קוב מים/דונם לשטיפת המערכת.

שילובים: בהעדר מידע, אין לשלב עם תכשירים אחרים.

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר התייבשות התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר היטב בשיטות המקובלות, 12 שעות נוספות לפני הכניסה מחדש.

סכנות לסביבה:

- התכשיר בעל השפעה שלילית לדבורים.
- התכשיר רעיל ליצורים החיים במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית.
- התכשיר עלול לחלחל למי תהום. ראה פירוט יישום בתווית המוצר.

דרגת רעילות: IV (מסוכן)

מס' או"ם: לא מסווג

מס' רישיון הגה"צ: 4235/ה.צ./2015

אריזות: 1, 5 ליטר