

ازהרות לאדם: <ul style="list-style-type: none"> • התכשיר מזיק בבליעה, שאיפה ובמגע עם העור • התכשיר עלול לגרום לגידרי בעיניים. <p>אמצעי בטיחות ומיגון:</p> <ul style="list-style-type: none"> • אין לאכול, לשחות או לעשן בזמן השימוש בתכשיר. • יש לבוש בגין עבודה ארוכים, נעליים סגורות, • משקפי מגן (לפי תקן 166-EN), כפפות גומי (לפי תקן 3/374-EN) ומסכה להגנה על דרכי הנשימה עם מסנן מסוג 3 (לפי תקן 3-FFP3-EN). • המנע מ מגע התכשיר עם הפנים, העיניים והעור. • לאחר שימוש התכשיר יש להתרחץ ולהחליף בגדים. • יש לכסם את בגין העבודה בנפרד מהכביסה הכללית. <p>סיכון לסביבה:</p> <ul style="list-style-type: none"> • התכשיר רעליל לדגים, ליוצרים החיים במים ולדבורים. • הוראות שימוש: <ul style="list-style-type: none"> • אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה. • השימושים הווטרנריים קובעים שימוש לא נכון בתכשיר אין להזין מעלי גירה בצלב מעופות שטופלו בתכשיר. יש לאבק את העופות בהתאם להנחיות המופיעות בטבלה שלහן ולודԶא כי הלול אטום וסגור כך שתימנע דליפת התכשיר לסביבה:
--

סוג הטפיל	טיפל	מי	מיקום הטפיל	הערות	קרדיות	
					עופות הטלה:	טיפול אחד באיזור הביב
		טיפול אחד על כל עוף (בעיקר ביצורי הכנפיים)	קרדיות הנוצה	יש לאבק את תא הטלה סמור למועד הקנסת העופות על הטיפול לפאי	בימים - בתאי הטלה כל תא אבקה על העופות	קרדיות העוף האדומת
		טיפול אחד על העוף (בעיקר באיזור הביב)	קרדיות העוף (בציפורים)	יש לאבק את תא הטלה סמור למועד הקנסת העופות על הטיפול לפאי	בימים - בתאי הטלה כל תא אבקה על העופות	קרדיות העוף האדומת
כינים		-	-	יש לחזור על הטיפול לאחר 10 ימים	על העוף (בחלקו הגוף השוניים)	על העוף (בחלקו הגוף השוניים)

<p>עזרה ראשונה ומידע לרופא:</p> <ul style="list-style-type: none"> • במקרה של מגע בעיניים - שטוף היפט במים זורמים לפחות 15 דקות לפחות ופנה מיד לקליטת טיפול רפואי. • במקרה של מגע בעור - שטוף היפט בהרבה מים זורמים וסבון. • במקרה והגירוי נמשך, פנה לקליטת טיפול רפואי. • במקרה של בליעת - אם הפגע בהכרה, השקה בלבד יותר מ- 2 כוסות מים והפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. אין לגרום להתקאה. אין להשיקות נפגע חסר הכרה. • במקרה של שאיפה - פנה את הנפגע למקום מאוורר. במקרה של אי נוחות או קשי נשימה, פנה לקליטת טיפול רפואי. במידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעות, ביה"ח רמב"ם, חיפה, טל: 000-777-04-00 <p>עזרה ראשונה ומידע לרופא:</p> <ul style="list-style-type: none"> • אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה. • השימושים הווטרנריים קובעים שימוש לא נכון בתכשיר שלא על פי הוראות התווית עלול לגרום במשתמש, בבעלות חיים, מסוכן לבリアות הציבור ולסביבה ומהוועה עבריה על החוק!

<p>זמן המתנה לשיווק ביצים - 24 שעות לאחר יישום התכשיר.</p> <p>טיפול תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לאסוף לכל אטום לא מגע ישיר עם הידיים ולהעבירו לאתר מורשה ע"י המשרד לאיכות הסביבה לפינוי פסולת רעלילה ברמת חובה. כמו כן, תכשיר שנשפך, פג תקפו או התקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת החיב בפניו לאתר פסולת רעלילה ברמת חובה.</p> <p>אחסון: יש לאחסן את התכשיר באזיותו המקורי במקומות מוצל נועל מיועד לאחסון תכשירים כימיים, הרחק מהישג ידים של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.</p> <p>טיפול באירוע ריקות: השלים את אריזת התכשיר הריקה לפחות אחת.</p>
--



مكافحة فش الطيور الحمراء يجحب رش المبني واقفاص
بض، المشارب والمعالف بمادة اكريتين 20% سائل بعد ا
لقن والمبني (ومعاودة الرش بعد 10 أيام) تبعاً لتعليمات

فترة الانتظار لجمع البيض 24 ساعة بعد

نهاية المادة المسكونية: مستحضر مسكون يغطي بالنجا
مع بواء مغلق وينقل لموقع النفايات السامة، وكذلك مست
للاحيته او تلف اثناء التخزين يعتبر نفايات سامة ويجب
الاتصال بالجهة المختصة

الخزين: يجب حزن مستحضر الاكريليتين بعبوته الأصلية
ادا خاص للمبيدات الكيماوية، وبعبدا عن متناول ايدي الاطفال

لأشخاص الغير مؤهلين إخلص من العبوات الفارغة: يجب القاء العبوات الفارغة في^{فنيات}

عافات أولية: بحال ملامسته للجلد اغسل المكان المصاب
صابون وبحال ملامسته للاعين اغسل جيداً بكمية كبيرة
ماء، وبحالة الشك بالتشمّس يجب التوجّه فوراً للطبيب مع من

الطبیب: المركز القطري للتسمم مستشفى رمبام
هاتف مركز السموم جامعة النجاح نابلس 000-500-500-500

اقررت وزارة الخدمات البيطرية ان استعمال غير سليم
للتلعيمات المرفقة قد يضر بالمستعمل والحيوانات وقد يسبب
على صحة الجمهور والبيئة ويشكل خرقا للقانون

A horizontal red graphic element consisting of three curved bands of varying lengths, positioned at the bottom of the page.

نوع الطفيلي	الطفيل(ا) الحشرة	مكان العلاج	المقادير	ملاحظات
الفش	فش الطيور الشمالي، فش الطيور الاستوائي	على الطائر (منطقة الجمع)	الدواجن البياضة 10 غرام للطائر	يجب التأكيد بأن القفص مغلق جيدا بطريقة تمنع تسرب المستحضر للبيئة المحيطة
вш الريش	فقط على الطائر (خاصة بمنطقة الاجنحة)	طيور التكثير 15 غرام للطائر	علاج واحد للطائر	
الفش الاحمر	المعاملة نهارا: باقفاصل التبييض المعاملة ليلا: على الطيور	بااقفاصل التبييض 10 غرام لكل قفص	يجب تعفير اقفاص التبييض قريبا من موعد الدخال الطيور للقن وإعادة المعالجة حسب الضرورة	
القمل	على الطائر وعلى كل أجزاء الجسم المختلفة	طيور بياضة 10 غرام للطائر طيور التكثير 10 غرام للطائر	يجب معاودة العلاج بعد 10 أيام	

اكريتين مسحوق 1%

مستحضر لمكافحة الفش والقمل على الطيور

اقرأ بتمعن تعليمات الاستعمال المرفقة قبل الاستعمال

المحتوى: بيرمترین (بنسب ایزومیریه تشریفات 25175، مواد حاملة غير فعالة)

بير: المستحضر يسبب لتهيج بالاعين والمسالك التنفسية والجلد
ائل الحذر والوقاية

ن التعامل مع المستحضر (تحضير الرش وتطبيقه) يجب استعمال وسائل وقائية مثل

بس عمل طويلة حذاء طويل ومغلق. قفازات (EN166) نظارات واقية (EN374(3)
مة نصف وجه (EN14387 APEK-1P3) مع فلتر متصل من نوع (EN140).

عند الانتهاء من التطبيق يجب غسل الايدي جيدا بالماء والصابون وغسل ملابس
ل بصورة منفردة من الملابس الأخرى

متنع من ملامسة المستحضر للاعين والجلد

اطر للبيئة: المستحضر سام للاسماس والكائنات المائية والنحل تعليمات الاستعمال
ب تغيير الدواجن تبعا للتعليمات الواردة في جدول الاستعمال