



ביג ג'יב



BIG-GIB

بيج جيب

תרכיז נוזלי (SL)

מווסת צמיחה

לשימוש בגפן, הדורים, קנרס, אפרסמון, אגס ופרחים

מכיל: 40 גרם בליטר Gibberellic Acid.

**כללי:** ביג ג'יב משמש כמווסת צמיחה לשימוש בגפן, הדורים, קנרס, אפרסמון, אגס ופרחים. התכשיר מכיל הורמון צמיחה, חומצה ג'יברלינית, הפועלת בריכוזים קטנים ומשפיעה פיסיולוגית ומורפולוגית על חלקי הצמח השונים.

אופן היישום:

| הגידול        | המטרה                     | מועד הטיפול  | ריכוז (חלקי מיליון) | כמות תכשיר (סמ"ק ל-100 ליטר מים) | מינון משטחים ושילובים (אחוז מנפח) | נפח תרסיס  | הערות מיוחדות   |
|---------------|---------------------------|--|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| גפן: סופרירור | דילול האשכול והגדלת הגרגר | שיא פריחה  | 1                   | 2.5                              | טריטון 100-X 0.025%               | הרטבה מלאה | הריסוס השני יעשה ע"י ריסוס מכוון לאשכול בלבד או ע"י טבילת האשכול בתמיסה |
|               |                           | גרגר 7-10 מ"מ  | 20                  | 50                               |                                   |            |   |
| גפן: תומפסון  | דילול האשכול              | 50% פריחה  | 15-20               | 37.5-50                          |                                   |            |   |
|               |                           | 70%-80% פריחה  | 15-20               | 37.5-50                          |                                   |            |   |
|               |                           | פריחה מלאה   | 30                  | 75                               |                                   |            |   |
| הגדלת הגרגר   |                           | לאחר גמר חנטה ולאחר מכן 2-3 ריסוסים נוספים במרווחים של 4-6 ימים, בהתאם לצורך | 30-40               | 75-100                           |                                   |            |   |

אופן היישום המשך:

| הגידול                              | המטרה  | מועד הטיפול                                    | ריכוז (חלקי מיליון) | כמות תכשיר (סמ"ק ל-100 ליטר מים) | מינון משטחים ושילובים (אחוז מנפח)             | נפח תרסיס     | הערות מיוחדות  |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|----------------------------------|---|---------------|--|
| הדרים: מהזן: ולנסיה                 | הפחתת קמטת                                   | סוף יולי-אמצע אוגוסט (טיפול יחיד)              | 20                  | 50                               | טריטון B-1956 0.025% בתוספת 0.1% חומצה זרחתית | 15-12 ליטר/עץ | -  |
| הדרים: פומלית, קליף מהזן: אור, מיכל | הארכת עונת קטיף                              | ריסוס לפני שבירת צבע אוקטובר (טיפול יחיד)      | 10                  | 25                               | טריטון B-1956 0.025% בתוספת 0.1% חומצה זרחתית | 15-12 ליטר/עץ | -  |
| הדרים: מהזן: אור                    | הגברת חנטה                                   | ריסוס בשיא פריחה                               | 50                  | 125                              | טריטון B-1956 0.025% או משטח L-77 0.05%       | 15-10 ליטר/עץ | -  |
| הדרים: מהזן: נובה                   |  |  | 25                  | 62.5                             |   |               |  |
| אשכולית לימון                       | שמירת פרי באחסון                             | ריסוס במערך האריזה במשולב עם דונג זיודר        | 50                  | 250 ב-200 ליטר דונג              | -   | -             | -  |
| קנרס מהזן: סגול                     | הקדמת הניבה בצמחים מפותחים בעלי 7 עלים לפחות | 1. ראשית אוקטובר<br>2. 12 יום אחרי ריסוס ראשון | 40                  | 100                              | -   | הרטבה מלאה    | יש לרסס לאחר השקיה, אין לרסס חלקות שאינן בהתפתחות תקינה, משובשות בעשבים או חולות אין לרסס בטמפרטורות גבוהות מ-30°C |

אופן היישום המשך:

| הגידול           | המטרה                               | מועד הטיפול   | ריכוז (חלקי מיליון) | כמות תכשיר (סמ"ק ל-100 ליטר מים) | מינון משטחים ושילובים (אחוז מנפח) | נפח תרסיס       | הערות מיוחדות |
|------------------|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| אפרסמון          | הפחתת נשירה                         | ריסוס יחיד בשיא הפריחה תחילת חנטה   | 30                  | 75                               | טריטון 0.025% 100-X               | הרטבה מלאה      | -             |
|                  | הארכת עונת הקטיפה וחיי האחסון והמדף | ריסוס יחיד כאשר מרבית הפרי בצבע צהוב                                      | 50                  | 125                              |                                   |                 |               |
| אגס מגיל 4 ומעלה | הגברת חנטה                          | בתחילת פריחה מלאה   | 20-10               | 50-25                            | טריטון 0.025% 100-X               | הרטבה מלאה      | -             |
| פרחים: גבסנית    | הארכת גבעול                         | בגיבסנית שתולה: לאחר התבססות השתיל. בגיבסנית גזומה: לאחר הופעת צימוח חדש. | 500                 | 125 ב-10 ליטר מים                | -                                 | הרטבת מרכז הצמח | -             |

**אזהרות:**

התכשיר ביג ג'יב הינו מווסת צמיחה, מנע רחף התרסיס לגידולים שכנים. רחף במינונים נמוכים של התכשיר בגידולים שאינם מופיעים בתווית יכול לגרום לנזק.

**מועד כניסה מחדש לשטח המטופל:** לאחר התייבשות התרסיס.

**סכנות לסביבה:**

אין סכנות מיוחדות. לא רעיל לדגים, ציפורים ודבורים.

**דרגת רעילות:** IV (מסוכן)

**מס' או"ם:** 1219

**רישיון הגה"צ:** 4106/ה.צ./2012

**אריזות:** 1, 5 ליטר