



# מפיסטו



Mefisto  
מאפיסטו

תרכיז נוזלי (SL)

קוטל חרקים

תכשיר סיסטמי להדברת מזיקים בגידולים שונים.

מכיל: 200 גרם בליטר Acetamidrid

קבוצת IRAC	מנגנון פעולה	משפחה כימית
4A	פגיעה בקולטן Nicotinic acetylcholine	Neonicotinoids

**כללי:** מפיסטו הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת הכלורוניקוטיניל המיועד להדברת מזיקים שונים. התכשיר פועל כרעל קיבה ומגע. לתכשיר רעילות נמוכה יחסית לבעלי דם חם.

## אופן היישום:

מועד אחרון לריסוס (ימים לפני קטיף)	הערות	נפח תרסיס (ליטר/דונם)	מינון (סמ"ק/דונם או אחוז מנפח)	המזיק	הגידול
120	הריסוס יינתן עם הופעת זחלי העש הראשונים של המזיק בעלים	הרטבה מלאה	0.025% (25 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	עש מנהרות ההדר	הדרים**
	-		0.015% (15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כנימת הספיראה, כנימת עלה הדלועיים	
	הריסוס יינתן לאחר החנטה בראשית הקיץ		0.075% (75 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כנימה קמחית כדורית	
	מועד הריסוס: עם תחילת נגיעות באביב-קיץ מוקדם	400-300 במפוח	0.025% (25 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כנימה אדומה	
	מועד הריסוס: עם תחילת נגיעות		0.025% (25 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כנימת השעווה הפלורידית	
45	-	200-150 לפי גודל העצים	0.05% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כנימת עלה התפוח	תפוח
			0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	עש התפוח, ציקדה ורדנית	



שמירה על הסביבה



מחייבות לבטיחות



איכות ללא פשרות



פיתוח מתקדם



ייצור כחול לבן



מועד אחרון לריסוס (ימים לפני קטיף)	הערות	נפח תרסיס (ליטר/דונם)	מינון (סמ"ק/ק"דונם או אחוז מנפח)	המזיק	הגידול
45	-	200-150	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	עש התפוח	אגס
30	מועד הריסוס: עם תחילת נגיעות	200-150 לפי גידול העצים	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	קפנודיס, חיפושית הקליפה עש המשמש (אנרסיה)	משמש, אפרסק, נקטרינה, שזיף
30	אם קיימת נוכחות אקריות במטע, הריסוס במפיסו עלול במקרים מסוימים לעודד אותן	100-150 לפי גודל העצים	0.04% (40 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	ציקדה ירוקה	אפרסק, נקטרינה
45	-	100-150 לפי גודל הגפנים	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	ציקדה ירוקה	גפן
20	ריסוס אחד בעונה	100-200 לפי גודל העצים	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	זבוב הזית	זית
25	-	120 - 250 (לפי גודל העצים)	0.025% (25 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	תריפס סורי ציקדה ירוקה	אפרסמון
15	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	100 - 150 לפי גודל העצים	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כנימת עלה הדלועיים, ציקדה ירוקה	רימון, שקד
15	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	200-150 לפי גודל העצים	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	קפנודיס עש המשמש (אנרסיה)	שקד
7	-	30 - 50 לפי גודל הצמחים	20	כנימת עלה הדלועיים	אבטיח, מלפפון
7	-	30 - 50 לפי גודל הצמחים	30	כנימת עש הטבק	פלפל, מלון, אבטיח, עגבנייה, מלפפון, קישוא, חציל
30	הריסוס יינתן עם הופעת זחלים ראשונים בעלים	20-10	25 ריסוס קרקע	כנימת עש הטבק	כותנה





מועד אחרון לריסוס (ימים לפני קטיף)	הערות	נפח תרסיס (ליטר/דונם)	מינון (סמ"ק/דונם או אחוז מנפח)	המזיק	הגידול
14	מועד הריסוס- עם תחילת הנגיעות	50 - 30	30	כנימת עש הטבק	תבלינים: מנתה
7		לפי גודל הצמחים			תבלינים: פטרוזיליה, כוסברה
-	ראה הערה *	60 - 30	30	כנימת עלה הדלועיים	פרחים: * היפריקום, ורד, סולידגו, חרצית, אסתר, גיבסנית, ליזיאנטוס
-		100 ומעלה (הרטבה מלאה)	0.03% (30 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כנימת עש הטבק	
10	-	50 - 30	15	חיפושית פרעושית	כרוב

**\*פרחים:**

**היפרקום** - בזן פינקי פלייר,  
**ורד** - בזן לבלירייד, ניופאיישן,  
**סולידגו** - טרה וגולדן גלורי,  
**חרצית** - סנואודאון,  
**אסטר** - קזבלנקה  
**גיבסנית** - קינג,  
**ליזיאנטוס** - קאלו לבן.

\*\* מפיסטו פוגע בחיפושית הרודוליה שטורפת את כנימת האיצריה ועלול להביא להתפרצות מזיק זה.

**שילובים:** ניתן לשלב את התכשיר מפיסטו עם החומרים הבאים:  
אפרסק ונקטרינה: ניתן לשלב עם 0.02% טולדו.  
בכל שילוב יש לפעול בכפוף לתווית התכשיר המשולב.

**מועד כניסה מחדש לשטח המטופל:** לאחר התייבשות התרסיס.

**סכנות לסביבה:**

התכשיר רעיל לדבורים במגע ישיר, אין לרסס בשעת פעילות הדבורים. מומלץ לסגור את הכוורות לקראת ערב ולרסס כאשר הדבורים לא פעילות בשטח, אין פגיעה בדבורי דבש 24 שעות לאחר הריסוס ובדבורי במבוס 30 שעות לאחר הריסוס.

**דרגת רעילות:** מסוכן לבריאות (III)

**מס' או"ם:** לא מסווג

**מס' רישיון הגה"צ:** 4062/ה.צ./2011

**אריזות:** 1 ליטר