



# סיימוקס

CYMOX  
سيموكس

גרגירים רחיפים (WG)

קוטל מחלות

קוטל פטריות להדברת כימשון וחלפת בתפוז ועגבניה

מכיל: Cyomoxanil 45%

משפחה כימית	מנגנון פעולה	קבוצת FRAC
Cyanoacetamide- oxime	לא ידוע	27

**כללי:** סיימוקס-X הינו תכשיר סיסטמי קצר פעולה. החומר הפעיל נקלט במהירות בעלים ובגבעולים ולכן מוגן מפני שטיפה. החומר הפעיל נע בתוך הצמח ומדביר את הפטרייה גם לאחר חדירתה לצמח ועד שלושה ימים לאחר ההדבקה.

### אופן היישום:

מועד אחרון לריסוס (ימים לפני קטיף)	נפח תרסיס (ליטר/דונם)	מינון (גרם/דונם או סמ"ק/ דונם)		המחלה	הגידול
		מינון השילוב	מינון סיימוקס		
12	40-20	מנצידן \ מנקודי 250 ג'/'ד'	110 ג'/'ד'	כימשון, חלפת <sup>1/</sup>	תפוח אדמה
		בראבו 200 סמ"ק/ד'	100 ג'/'ד'		
		דיימונד 50 סמ"ק/ד' + מנצידן 250 ג'/'ד'	80-60 ג'/'ד'		
		דיימונד 50 סמ"ק/ד' + בראבו 200 סמ"ק/ד'	80-60 ג'/'ד'		
		מילור 300 ג'/'ד'	100 ג'/'ד'		
5	100-20	מנצידן \ מנקודי 250 ג'/'ד'	110 ג'/'ד'	כימשון, חלפת <sup>1/</sup>	עגבנייה
		בראבו 200 סמ"ק/ד'	100 ג'/'ד'		
		דיימונד 50 סמ"ק/ד' + מנצידן 250 ג'/'ד'	70 ג'/'ד'		

<sup>1/</sup> - מתייחס לשילובים בהם התכשיר המשולב בסיימוקס נותן מענה לחלפת.



#### הערות:

- השילוב עם תכשירי מנקזב או כלורותלונל נועד על מנת למנוע התפתחות עמידות.
- המינון הנמוך עבור טיפול מניעה או ברמת נגיעות נמוכה.
- מרווח בין ריסוסים: 5-10 ימים בהתאם לעוצמת הנגיעות, התנאים המטאורולוגיים והתכשיר המשולב.
- אין לשלב עם קוטלי פיטריות בעלי pH בסיסי.

#### מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: כעבור 12 שעות.

בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי

#### סכנות לסביבה:

- אינו רעיל לדבורים.
- התכשיר רעיל לחי במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

דרגת רעילות: IV (מסוכן)

מס' או"ם: 3077

מס' רישיון הגה"צ: 4078/ה.צ./2011

אריזות: 1, 5 ק"ג

יצרן: Zhejiang Hetian, CHINA



שמירה על הסביבה



מחייבות לבטיחות



איכות ללא פשרות



פתוח מתקדם