



# פאסטר



## תרכיז נוזלי (SL) קוטל עשבים כללי בלתי בררני לקטילת צמחייה חד ורב שנתית קיימת

מכיל: 200 גרם בליטר Glufosinate ammonium

משפחה כימית	מנגנון פעולה	HRAC
Phosphinic acid	עיקוב גלוטמין סינטאז	H

**כללי:** פאסטר קוטל עשבים כללי המיועד להדברת עשבים בפרדס, מטע, כרם, להכנת שטחים למזרע או שתילה, לשטחי בור ולהקמת נוף בתפוחי אדמה. התכשיר קוטל עשבים כללי בלתי בררני, הקוטל במגע צמחיה חד שנתית ורב שנתית קיימת. התכשיר אינו מונע הצצה של עשבים רעים או צמחי תרבות. קליטת התכשיר מתבצעת דרך חלקי הצמח הירוקים, אין קליטה דרך מערכת השורשים. עשבים רב שנתיים מרססים בשיא צמיחתם, סמוך או במשך פריחתם. עשבים חד שנתיים מרססים בגמר הצצה. להשגת יעילות מרבית דרוש שטח עלווה מספיק לקליטת התכשיר. הדברה מרבית מושגת תוך 7 עד 10 ימים מהריסוס, בהתאם לתנאי מזג האוויר וחיוניות הצמחים. בתנאי טמפ' גבוהים ניתן לצפות לפעילות מהירה יותר. יש להימנע מהמטרה במשך 48 שעות מריסוס. גשם היורד פחות מ-6 שעות לאחר הריסוס מפחית מיעילות הטיפול.

### אופן היישום: א. הדברת עשבים כללית, פרוט גידולים מינונים ועשבי מטרה:

טיפול במוקדים		מינון בסמ"ק לדונם <sup>1/</sup>	עשבים מודברים		הגידול
נפח תרסיס	ריכוז אחוז מנפח				
25	1	250	בגובה עד 10 ס"מ	חד שנתיים : דגניים ורחבי עלים	אבוקדו, פרדס, תמר, גפן, אפרסמון, שקד, אגס, תפוח, אפרסק, נקטרינה, שזיף, רימון, גודגדן
	2	500	בגובה עד 40 ס"מ		
30	1	300	ינבוט, חבלבל השדה		להדברת עשבים קיימים בגן ונוי
40	1.5	600	ארכובית שבטבטית, דורת ארם צובה (קוצאב), קיקיון, פספלון דו טורי		להכנת שטחים לפני זריעה או שתילה*
50	2	1000	הגה, סולנום זיתני, יבלית, חילף החולות, משיין גלילי, דוחן, פספלון מורחב, זקנקן		לאורך פסי רכבת וצדי דרכים בינעירוניות, סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז
20	1.5	300	לאחר הצצה צמחים בגובה 20 ס"מ	גומא הפקעים	שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות.
30	2	600	צמחים מפותחים בפריחה		
100-50	2	--	קנה מצוי, טיון דביק, אשל, שרביטן מצוי, פטל קדוש, חנק, לנטנה, אספרג החורש		

1/ -בטיפול רצוף נפח התרסיס יהיה בין 25 ל-50 ליטר לדונם, לפי גודל וגובה העשבייה. יש לדאוג להרטבה מלאה של הנוף.



- i. **הדברת עשבים במטע, פרדס וכרם** – ניתן ליישם את התכשיר מייד לאחר הנטיעה ובמשך הגידול. מרססים בהעדר רוח. אין לרסס על חלקים ירוקים של צמחי התרבות ועל גזעים בלתי מעוצים. בעצים בעלי גזע מעוצה מותר לרסס את בסיס הגזע. אין לרסס במזג אוויר שרבי, רחף של פאסטר הפוגע בעלווה של עצים גלעיניים עלול לגרום לנשירת העלים שנפגעו.
  - ii. **להכנת שטחים למזרע או לשתילה של גידולי שדה**, ירקות ופרחים. להדברת עשבים במינון 250-1000 סמ"ק/ד' בהתאם לגודל העשבים כמפורט בטבלה א'.
  - iii. **הדברת עשבים קיימים בגן הנוי**: ניתן לטפל בתכשיר פאסטר בכל זמן שהוא. מרססים בתנאים ללא רוח. אין לרסס חלקי עץ ירוקים או על גזעים בלתי מעוצבים. בקרקע קלה או חולית יש לחכות שלושה ימים בין ריסוס לזריעה או שתילה של צמח התרבות.
- מינון: 250-1000 סמ"ק/ד' בהתאם לגודל העשבים כמפורט בטבלה א'.

**ב. הקמלת נוף בתפוח אדמה (לא בחלקות המיועדות לזרעים):**

גידול	מטרה	מועד היישום (ימים מזריעה)	מינון (סמ"ק/דונם)	נפח תרסיס	ימים מיישום לאסיף
תפוח אדמה מהזנים: מונדיאל, דזירה, נייטה, רודאו	הקמלת נוף	115 – 130 בהתאם למועד המזרע	300	20-30	7

**מועד היישום:** לקראת האסיף בהגיע הצמחים והפקעות לבשלות מלאה ולגודל המלא הראוי לשיווק.

**קצב הקמלה:** הקמלה מלאה של נוף הצמחים תושג בחלוף 7-10 ימים מריסוס, בהתאם לתנאי מזג האוויר וחיוניות הצמחים. בחשיפה לתנאי אור מלא ולטמפ' גבוהה קצב ההקמלה מהיר יותר.

**הדברת עשבים:** הטיפול בפאסטר להקמלת נוף תפוא"א ידביר גם עשבים קיימים רגישים (דגניים ורחבי עלים).

**מגבלות:** אין לרסס פאסטר אם צפוי לרדת גשם בפרק זמן של 6 שעות לאחר הריסוס. אין לטפל על עלווה רטובה מחשש למיהול ולנגר של התכשיר. אין לרסס פאסטר על צמחים בטרם הגיעו לשלב הזדקנותם הטבעי המלא. אין לרסס פאסטר בשדות המיועדים לייצור זרעים.

**שילובים:** בהעדר מידע אין לשלב את התכשיר עם תכשירי הדברה אחרים.

**מועד כניסה מחדש:** לאחר 12 שעות.

**סכנות לסביבה:**

- אינו רעיל לדבורים.
- רעיל לחי במים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

**דרגת רעילות:** מסוכן (IV)

**מס' או"ם:** לא מסווג

**מספר רישיון הגה"צ:** 06/ה.צ./1871

**אריזות:** 1,5 ליטר

