פרמתרול פלוס

Permethrol plus

بيرمترول بلوس

תרכיז מתחלב

מכיל: Permethrin 10%

(ביחס איזומרי ציס/טרנס 75/25)

+ סינרגיסט PBO 40%

להדברת זבובים בלולים וברפתות
ללא נוכחות בעלי חיים.

לשימוש ווטרינרי בלבד

לא לשימוש ביתי

קרא בעיון את כל ההוראות לפני השימוש בתכשיר

רישיון השרותים הווטרינרים במשרד החקלאות מס׳ 1183

תוקף הרישום: 12/2024

אצווה: מק״ט:

בתוקף עד:

תכולה: 1 ליטר

מיוצר ומשווק ע״י:

תפזול

תעשיות כימיות בע״מ

רח׳ הסוללה 1, א.ת. מערבי בית שמש 99052

טל. 02-9926040 פקס. 02-9926050

www.tapazol.co.il

אזהרות לאדם:
- התכשיר מזיק בבליעה.
- התכשיר עלול לגרום לגירוי קל בעור ובעיניים.

אמצעי בטיחות ומיגון:
- אין לשתות, לאכול או לעשן בעת הטיפול בחומר.
- בעת העבודה עם התכשיר (הכנת התרסיס ויישומו) יש להשתמש באמצעי הגנה מתאימים: משקפי מגן (תקן EN-166), כפפות ניטריל (תקן EN-374/3) ובגדי עבודה ארוכים. מסיכת חצי פנים EN-140 עם מסנן EN-14387 מסוג ABEK-P3.
- יש להתרחץ ולהחליף בגדים לאחר הריסוס.
- לאחר היישום, יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.

סיכונים לסביבה:
- התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית. אין לזהם מאגרי מים.
- התכשיר רעיל לדבורים ולמאביקים נוספים. אין לרסס בזמן שקיימת פעילות דבורים ובסמוך לכוורות. אין לרסס על צמחים פורחים המפרישים צוף ו/או אבקה. מומלץ לרסס שעה לפני השקיעה ובשעות הערב (ולא בשעות הבוקר המוקדמות) ויש להימנע מריסוס בתנאים של רוח חזקה.

הוראות שימוש:
- יישום התכשיר במבני משק ריקים בלבד **<u>ללא נוכחות בע״ח</u>**.
- אין ליישם את התכשיר על מזון בעל החיים.
- יש לנקות את המבנה מזבל או רפד לפני תחילת הטיפול מכיוון שאלה משמשים מקום דגירה לזבובים.
- יש ליישם את התכשיר רק לאחר שטיפת מבנה הלול או הרפת.
- לפני יישום התכשיר ברפת יש לסגור את מכסה החלב ולכסות את אמצעי החליבה.
- אין לאחסן תחליב מוכן לשימוש. יש להשתמש תמיד בתחליב טרי.

מינון: יש לדלל במים ביחס של 1:100 (50 מ״ל תכשיר לכל 5 ליטר מים או 1 ליטר תכשיר לכל 100 ליטר מים).
יש לרסס בתחליב המדולל את הרצפה והקירות עד גובה 1 מ׳ בכמות של 1 ליטר תחליב ל- 20 מ״ר. יש לחזור על הטיפול מדי 7 – 14 ימים לפי הצורך.

אכלוס מחדש: כעבור 6 שעות.

טיפול בתכשיר שנשפך: יש לכסות בנסורת או בחול, לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי בכלי אטום לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. יש למנוע הגעת התכשיר למקורות מים וביוב מנע מגע התכשיר עם בעלי חיים ואנשים שאינם מורשים ללא אמצעי מיגון מתאימים.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה הריקה היטב, לפחות שלוש פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

אחסון:
- יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום נעול, מוצל ומאוורר, המיועד לאחסון תכשירים כימיים.
- הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
- הרחק ממקור חום ואש.

עזרה ראשונה:
- במקרה של מגע **בעיניים**- שטוף היטב במים זורמים למשך 15 דקות לפחות ופנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- במקרה של מגע **בעור** – רחץ היטב בהרבה מים זורמים וסבון. במידה והגירוי נמשך, פנה לקבלת טיפול רפואי.
- במקרה של **בליעה** – אם הנפגע בהכרה, השקה בלא יותר מ-2 כוסות מים והפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. אין לגרום להקאה. **אין להשקות נפגע חסר הכרה.**
- במקרה של **שאיפה** – פנה את הנפגע למקום מאוורר. במקרה של אי נוחות או קשיי נשימה, פנה לקבלת טיפול רפואי.

מידע לרופא:
המרכז הארצי למידע בהרעלות, ביה״ח רמב״ם חיפה, טל: 04-7771900,
במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.

אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך אחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה. השירותים הווטרינרים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר, שלא עפ״י הוראות התווית, עלול להיות מסוכן למשתמש, לב״ח, לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק!

עדכון תווית 1.2019