



# פרפקט

PERFECT  
ברפיקט

**תרכיז מתחלב (EC)  
קוטל חרקים  
להדברת זחלי עשים, אקריות ותריפסים בירקות, גידולי שדה,  
תבלינים ופרחים**

מכיל: 19.2 גרם בליטר Emamectin benzoate

| קבוצת IRAC | מנגנון פעולה          | משפחה כימית |
|------------|-----------------------|-------------|
| 6          | מערכת העצבים והשרירים | Avermectins |

**כללי:** התכשיר פרפקט משמש כקוטל חרקים ואקריות המתאים למגוון גידולים. החומר הפעיל בתכשיר פרפקט, Emamectin benzoate, הינו תוצר טבעי של מיקרואורגניזם בקרקע. התכשיר נספג ברקמות הצמח ומועבר אל הזחלים, בעיקר דרך מערכת העיכול וגורם לפגיעה במערכת העצבים ולכוסר האכילה. כתוצאה מכך, החרק מת לאחר 2-5 ימים. שאריות החומר שלא נספגו אל רקמות הצמח מתפרקות תוך מספר שעות. בשל רגישות התכשיר לאור, רצוי ליישמו בשעות המוקדמות של היום או לפנות ערב.

### אופן היישום:

| הגידול       | המזיק   | ריכוז (אחוז מנפח) ריסוס לנגירה | מינון (סמ"ק/דונם) בנפח קטן: 70-30 ליטר/דונם) | מועד אחרון ליישום (ימים לפני קטיף) | הערות |
|--------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| תפוח אדמה    | לפיגמה, פלוסייה, פרודניה, תנשמית האביב (הליוטיס), עש הפקעות             | -                              | 60   | 7                                  | -     |
| פלפל         | אקריות העיוותים   | -                              | 40   | 7                                  | -     |
| עגבניה       | אקרית חלודה, פלוסייה, תנשמית האביב (הליוטיס), עש הפקעות, טוטה אבסולוטה* | -                              | 40   | 7                                  | -     |
| עירית, בצל   | תריפס הטבק  | -                              | 60 +<br>נימגראד 1%                           | 7                                  | -     |
| כרוב, כרובית | עשית המצליבים (עש הכרוב), עש לב הכרוב, תריפס הטבק                       | -                              | 40   | 7                                  | -     |
|              | פרודניה   | -                              | 60   |                                    |       |
| סלרי, חסה    | פרודניה   | -                              | 60   | 7                                  | -     |



| הגידול  | המזיק                                    | ריכוז (אחוז מנפח) ריסוס לנגירה          | מינון (סמ"ק/דונם) (בנפח קטן: 70-30 ליטר/דונם) | מועד אחרון ליישום (ימים לפני קטיף) | הערות   |
|---|--|---|---|------------------------------------|---|
| תות שדה   | פרודניה                                  | -                                       | 60  | 7                                  | -   |
| תבלינים: מנטה, מרווה, הוקולה רוזמרין, קורנית, טרגון, עירית, ריחן שמיר, פטרוזיליה, כוסברה                        | פרודניה, פלוסייה, לפיגמה, עש הרקפת       | -                                       | 60  | 7                                  | -   |
|   |  |   |   | 3                                  |   |
| תירס מתוק   | עשנור התירס (נובר התירס) האירופי, לפיגמה | -                                       | 60  | 7                                  | -   |
| כותנה   | תנשמית האביב (הליוטיס)                   | -                                       | 40  | 30                                 | -   |
| רימון   | כחליל הרימון                             | 0.05%                                   | -   | 3                                  | -   |
| אפרסק   | עש המשמש (אנרסיה)                        | 0.04%-0.06% (60-40 סמ"ק ל-100 ליטר מים) | -   | 14                                 | להדברת זחלים באמירי הצימוח יש לרסס מייד עם גילוי נבירות הזחלים בקצות הצימוח. להדברת זחלים בפרי יש לרסס עם גילוי הנבירות הראשונות בפרי.  |
| נקטרינה   | תריפס הטבק                               | 0.06% (60 סמ"ק ל-100 ליטר מים)          | -   | 14                                 | למניעת פגיעה בדבורים מרססים בלילה, החל מ-10% פריחה ועד סופה מדי 4-7 ימים בהתאם להתקדמות הפריחה.   |
| אורן  | תהלוכן האורן (טוואי התהלוכה)             | -                                       | הזרקה לגזע (המינון ל-1 ס"מ קוטר גזע): 1 סמ"ק  | -                                  | יש לקדוח חורים בהיקף גזע העץ בקוטר של 1 ס"מ בעומק של כ-7 ס"מ, בזווית של 45 מעלות כלפי מטה, בגובה 40-60 ס"מ מהקררקע, ובמרחקים שווים ביניהם. לכל חור יש להזריק כ-5 סמ"ק מהחומר. יש לחשב את כמות החומר לעץ ולפי זה את מספר החורים הנדרש. |
| ורד **  | פרודניה, לפיגמה                          | 0.06% (60 סמ"ק ל-100 ליטר מים)          | 60  | -                                  | ניתן לריסוס גם במערפל ("פוגר") קה.  |
| פרחים ***<br>אספרג, אסטר, ארליה, גרברה, ליזיאנטוס, לימוניום, סולידגו, פטוניה, חרצית, פיטוספורום, כלנית, גיבסנית | פרודניה, לפיגמה, תנשמית האביב (הליוטיס)  | 0.06% (60 סמ"ק ל-100 ליטר מים)          | 60  | -                                  | -   |



\*לא יותר מ-2 ריסוסים עוקבים.  
\*\*ורד מהזן אברה  
\*\*בפרחים מהזנים: אספרג מהזן מירוקלדיוס אסטר מהזן קזבלנקה, גיבסנית מהזן טנגו, גרברה מהזן סוביניר, ליזאנטאוס מהזן קליבר לבן, לימוניום מהזן סופריים וייט, סולידגו מהזן גולדן גלורי, פטוניה מהזן זקופה סגולה, חרצית מהזן ניודאי, פיטוספורום מהזן ירוק וכלנית מהזנים גליל ומרום.

## הערות:

- יש להימנע מריסוס בטמפרטורות גבוהות במיוחד.
- רצוי לרסס בשעות הבוקר המוקדמות או לפנות ערב כיוון שהתכשיר מתפרק באור.

## שילובים:

בתפו"א ניתן לשלב עם דיימונד ת.ר., סיימוקא ג.ר. וברק ת.ר.

**מועד כניסה מחדש לשטח המטופל:** לאחר 24 שעות. בבתי צמיחה ומנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות, בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן איש

## סכנות לסביבה:

- התכשיר רעיל מאוד לדבורים, באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.
- רעיל לדגים וליצורים החיים במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית. אין לזהם מקורות מים ובריכות דגים.

**דרגת רעילות:** מסוכן (IV)

**מס' או"ם:** 3082

**מס' רישיון הגה"צ:** 4126/ה.צ./2012

**אריזות:** 1, 5 ליטר