



מאושר לשימוש
בחקלאות אורגנית



בלוז
BLUES
בלוז

תרכיז רחיק (SC)

קוטל מחלות

למניעת מחלות בפרדס, במטע ובירקות

מכיל: 582 גרם בליטר (42% Copper hydroxide)
אקוויולנטי ל- 388 גרם בליטר (28%) נחושת מתכתית

משפחה כימית	מנגנון פעולה	קבוצת FRAC
inorganic	השפעה על קישור רב אתרי	M1

כללי: בלוז הינו תכשיר המבוסס על נחושת להדברת מחלות הנגרמות ע"י חיידקים ופטטריות בהדרים, ירקות ומטעים.

אופן היישום:

הערות	מועד אחרון ליישום (ימים לפני קטיף)	נפח תרסיס (ליטר/דונם)	מינון/ריכוז (סמ"ק לדונם או אחוז מנפח)	מחלה	גידול
רצוי ליישם טרם הופעת המחלה. יש לרסס את המחצית התחתונה של נוף העץ לפני עונת הגשמים. הריכוז הנמוך יעיל עד 250 מ"מ גשם והגבוה עד 400 מ"מ גשם, יש לחזור על הריסוס לאחר ירידת כמות הגשמים הרשומה.	7	400-200	0.25%-0.3%	ריקבון חום	הדרים
יש לרסס לפני התחלת עונת הגשמים. במידה וירד 150-200 מ"מ גשם, יש לחזור על הטיפול. הריכוז הגבוה מיועד לחלקות עם הסטוריית נגיעות גבוהה	7	עד נגירה	0.25%-0.3%	עין טווס	זית
יש להתחיל לרסס לצורך מניעה לפני סגירת נוף ולהמשיך לרסס במרווחים של כל 7 ימים	7	40-20 בהתאם לגודל הנוף	200-100	כימסון	תפוח אדמה

הערות	מועד אחרון ליישום (ימים לפני קטיף)	נפח תרסיס (ליטר/דונם)	מינון/ריכוז (סמ"ק לדונם או אחוז מנפח)	מחלה	גידול
טיפול מניעה כל 7 ימים המינימום הגבוה בעגבניות מפותחות.	7	50-30	200-100	כימסון	עגבנייה
מרססים מדי 10-14 ימים בהתאם לעוצמת הנגיעות	7		0.08%	חירכון	אגס (עד בצבוץ ירוק)
בשלב תרדמה ולא יאחר מתחילת בצבוץ ירוק.	7	ריסוס עד נגירה	0.25%	השחרה חידקית	מנגו

הערות לטיפול:

התכשיר מיועד לטיפול מניעה. יש לרסס במרווחים של 7-14 ימים. דאג לכיסוי מלא על עלוות הגידול. אין לטפל בשטחים המיועדים למרעה. אין לרסס בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה או שרב או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה. מנע רחף התרסיס לגידולים שכנים.

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל:

לאחר 48 שעות. בבתי צמיחה ובחממות יש לאוורר בשיטות המקובלות ל-12 שעות נוספות.

סכנות לסביבה:

- רעיל מאוד לחי במים עם השפעות שליליות ממושכות. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ומקורות מים.
- התכשיר בעל רעילות נמוכה לדבורים.

דרגת רעילות: III (מסוכן לבריאות)

מס' או"ם: 3082

מס' רישיון הגה"צ: 4501/הג"צ/2023

מספר רישוי חקלאות אורגנית: 7509/הג"צ/2023

אריזות: 5 ליטר