



טוויסט

TWIST

טויסט

תרכיז רחיף (SC)

קוטל מחלות משולב להדברת מיני עובשים וקשיונה גדולה בירקות וגפן

מכיל: Fludioxonil 75 g/L + Pyrimethanil 325 g/L

מספחה כימית	מנגנון פעולה	קבוצת FRAC	חומר פעיל
anilino-pyrimidines	עיכוב סינטזה של חומצות אמינו וחלבונים	9	Pyrimethanil
Phenylpyrroles	מעכב מעבר אותות	12	Fludioxonil

כללי: טוויסט הינו קוטל מחלות המשלב שני חומרים פעילים מקבוצות כימיות שונות להדברת מיני עובשים וקשיונה גדולה בירקות וגפן.

אופן היישום:

הערות	מועד אחרון לריסוס (ימים לפני קטיף)*	ריכוז (אחוז מנפח) בריסוס מעל 100 ליטר/דונם	מינון (סמ"ק/דונם)	המחלה	גידול
יש לדאוג לכיסוי מיטבי של הצמחים בתריסים	3	0.2	200	עובש אפור (בוטריטיס)	עגבנייה
	3	0.2	200	עובש אפור (בוטריטיס) קשיונה גדולה	חציל
	3	0.2	200	עובש אפור (בוטריטיס) קשיונה גדולה	מלפפון
	7				קישוא
	3	0.2	200	עובש אפור (בוטריטיס) ריקבון מימי (ריזופוס)	תות שדה
הריסוס בכרם ימנע התפתחות בוטריטיס לאחר הקטיף באחסון ובמשלוח. מועד הריסוס: 3 שבועות לפני הבציר.	14	0.2	-	עובש אפור (בוטריטיס) ריקבון מימי (ריזופוס) עובש שחור (אספרגילוס)	גפן

* ישום אחד בריסוס ללא שילובים.



שילובים:

בהעדר מידע, אין לשלב עם תכשירים אחרים.

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל:

לאחר התייבשות התרסיס או לאחר 24 שעות. בבתי צמיחה ומנהרות עבירות יש לאורר היטב בשיטות המקובלות 12 שעות נוספות לפני הכניסה מחדש.

סכנות לסביבה:

- התכשיר רעיל לחי במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית. אין לזהם מקורות מים ובריכות דגים.
 - התכשיר אינו רעיל לדבורים.
 - אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן:
 - א. מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקה הנמצאת עד 3 ק"מ ממזרחה מקו הים.
 - ב. מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ ממזרחה מקו הים.
 - ג. מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ ממזרחה מקו הים.
- לא נכללות באיסור זה חלקות בהן: שיעור חרסית הקרקע הוא 15% ויותר, או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא 1% ויותר.

דרגת רעילות: IV (מסוכן)

מס' או"ם: 3082

מס' רישיון הגה"צ: 4387/צ/2023/הג"צ

אריזות: 5, 1 ליטר



שמירה על הסביבה



מחויבות לבטיחות



אכילת ללא פשרות



פיתוח מתקדם



ייצור כחול לבן

תאריך עידכון: 06.2025